

ENTSCHEIDUNGSHILFE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN



| Name | enthaltene Komponenten | Saatsstärke in kg/ha | Aussaattermin | Gelbsenf | nem.res Senf | Ölrettich | nem.res. Ölrettich | multires. Ölrettich (Kartoffel-FF) | Buchweizen | Gräser | Leguminosen | Legu-Anteil ca. Samen-% | Düngung hilfreich? | Getreide-FF | Raps-FF | Mais-FF | Kartoffel-FF | Rüben-FF | Leguminosen-FF |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------|--------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|----------|----------------|
| HumusAktiv Kartoffel-fit | Ölrettich, Sommerwicken | 40-50 | bis Ende August | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | 30 | nein | + | + | ++ | +++ | ++ | |
| HumusAktiv Kartoffel-fit plus | Ölrettich, Sommerwicken, Rauhafer | 35-40 | bis Mitte August | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 8 | ja | + | + | ++ | +++ | ++ | |
| HumusAktiv Mais-fit | Ölrettich, Senf, Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Buchweizen, Leindotter, Perserklee | 15-20 | bis Mitte September | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | 24 | ja | +++ | | +++ | | | |
| HumusAktiv Mais-fit plus | Alexandrinerklee, Kresse, Perserklee, Ramtillkraut, Sonnenblume, Sorghum, Phacelia, Ölrettich, Leindotter, Senf | 10-15 | bis Ende August | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | 27 | ja | +++ | | +++ | | | |
| HumusAktiv Raps/Getreide-fit | Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Öllein, Perserklee, Phacelia | 10-15 | bis Ende September | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 21 | nein | +++ | +++ | ++ | | + | |
| HumusAktiv Raps/Getreide-fit plus | Felderbse, Sommerwicke, blaue Süßlupine, Buchweizen, Alexandrinerklee, Öllein, Phacelia, Ramtillkraut | 50-60 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | 40 | nein | +++ | +++ | ++ | | | |
| HumusAktiv Raps Zuckerrübe Legufrei | Öllein, Phacelia, Ramtillkraut, Rauhafer | 17-22 | bis Ende September | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 0 | ja | ++ | +++ | + | | ++ | +++ |
| HumusAktiv Vielfalt | Öllein, Phacelia, Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Perserklee, Ölrettich, Felderbse, Ramtillkraut, Rauhafer, Sommerwicke, Sonnenblume | 20-25 | bis Mitte August | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | 48 | nein | +++ | +++ | +++ | + | + | |

ENTSCHEIDUNGSHILFE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN



| Name | enthaltene Komponenten | Saatsstärke in kg/ha | Aussattermin | Gelbsenf | nem.res Senf | Ölrettich | nem.res. Ölrettich | multires. Ölrettich (Kartoffel-FF) | Buchweizen | Gräser | Leguminosen | Legu-Anteil ca. Samen-% | Düngung hilfreich? | Getreide-FF | Raps-FF | Mais-FF | Kartoffel-FF | Rüben-FF | Leguminosen-FF |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------|--------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|----------|----------------|
| HumusAktiv Vielfalt plus | Alexandrinerklee, blaue Süßlupine, Spitzwegerich, Felderbse, Gelbklee, Inkarnatklee, Michels Klee, Öllein, Perserklee, Phacelia, Ramtillkraut, Rotklee, Schwedenklee, Sommerwicke, Sonnenblume, Sorghum, Tiefenrettich, Winterwicke | 22-28 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 46 | nein | +++ | +++ | +++ | + | + | |
| HumusAktiv Zuckerrüben-fit | Gelbsenf, Phacelia | 12-15 | bis Ende August | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | ++ | | ++ | | +++ | +++ |
| HumusAktiv Zuckerrüben-fit plus | Gelbsenf, Ölrettich, Phacelia, Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Öllein | 15-20, | bis Ende August | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | ++ | | ++ | | +++ | |
| HumusAktiv Easy fit I | Ölrettich, Senf, Winterfutterraps | 15-20 | bis Mitte September | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | +++ | | ++ | | | +++ |
| HumusAktiv Easy-fit II | Ölrettich, Senf, Ramtillkraut | 15-20 | bis Mitte September | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | +++ | | ++ | | | +++ |
| HumusAktiv Easy-fit III | Gelbsenf, Ramtillkraut, Öllein | 15-20 | bis Ende August | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | +++ | | ++ | | | +++ |
| HumusAktiv Trio | Öllein, Phacelia, Ramtillkraut | 12-15 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 | ja | ++ | ++ | ++ | | ++ | +++ |
| HumusAktiv Blühendes Land | Öllein, Phacelia, Rauhafer, Sommerwicke, Sonnenblume | 27-30 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 7 | nein | +++ | +++ | ++ | | ++ | ++ |



ENTSCHEIDUNGSHILFE GPS & FUTTERBAU



| Name | enthaltene Komponenten | Saatstärke in kg/ha | Aussaattermin | Gelbsenf | nem.res Senf | Ölrettich | nem.res. Ölrettich | multires. Ölrettich (Kartoffel-FF) | Buchweizen | Gräser | Leguminosen | Legu-Anteil ca. Samen-% | Düngung hilfreich? | Getreide-FF | Raps-FF | Mais-FF | Kartoffel-FF | Rüben-FF | Leguminosen-FF |
|---|--|---------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|----------|----------------|
| HumusAktiv Futter-fit Klee gras | Welsches Weidelgras, Inkarnatklee, Rotklee | 30-35 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 54 | nein | +++ | + | +++ | | + | |
| HumusAktiv Futter-fit Landsberger Gemenge |  Welsches Weidelgras, Inkarnatklee, Winterwicke | 35-45 | bis Ende August | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 52 | nein | +++ | + | +++ | | + | |
| HumusAktiv Wickroggen GPS |  Grünschnittroggen, Winterwicke | 90-120 | bis Oktober | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 9 | ja | +++ | +++ | +++ | | + | |

ENTSCHEIDUNGSHILFE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN



| | Name | enthaltene Komponenten | Saatstärke in kg/ha | Aussattermin |
|-----------|---|--|--|---------------------------------------|
| Wildacker | Hegering Universal | Buchweizen, Waldstaudenroggen, Winterraps, Süßlupinen, Ölrettich, Winterrübsen, Lein, Rotklee, Perserklee, Serradella, Inkarnatklee, Schwedenklee, Steinklee, Stoppelrüben, Markstammkohl | 40 kg/ha | Mai bis September |
| Wildacker | Hegering Spezial | Sonnenblumen, Süßlupinen, Futtererbsen, Sommerwicken, Futterraps, Ölrettich, Buchweizen, Lein, Rotklee, Weißklee, Phacelia, Stoppelrüben, Gelbsenf, Markstammkohl, Serradella | 20 kg/ha | April bis Mai |
| Wildacker | Hegering Rehwild | Rauhafer, Futtererbsen, Buchweizen, Rotklee, Sommerwicken, Lein, Winterraps, Winterrübsen, Sonnenblumen, Perserklee, Phacelia, Esparsette, Ölrettich, Markstammkohl, Gelbsenf, Stoppelrüben, Süßlupinen | 40-50 kg/ha | April bis Juni |
| Wildacker | Hegering Niederwild | Rauhafer, Buchweizen, Erbsen, Winterraps, Gelbsenf, Phacelia, Ölrettich, Winterrübsen, Sonnenblumen, Lein | 20 kg/ha | April bis August |
| AUM | ECO SCHEMES 1B/C NRW HE SH BW SN RP SL | Buchweizen, Esparsette, Fenchel, Luzerne, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Rotklee, Sonnenblume, Weißklee | 20-25 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | ECO SCHEMES 1B/C BB | Borretsch, Buchweizen, Dill, Kornblume, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Sonnenblume, Weißer Senf | 20-25 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | ECO SCHEMES 1B/C TH ST BY | Borretsch, Buchweizen, Dill, Fenchel, Gartenkresse, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Sonnenblume | 18-22 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | ECO SCHEMES 1B/C NI | Borretsch, Buchweizen, Dill, Fenchel, Gartenkresse, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Serradella, Sonnenblume | 20 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | Stangenbohnen für Mais- Stangenbohnen Gemenge | Mix aus verschiedenen Stangenbohnsorten | Eine Einheit reicht für 2 ha (4 Kö./m ² Bohne, 8 Kö./m ² Mais) | Mai bis Juni |
| AUM | Blühende Untersaat Niedersachsen (einjährig) | Sommerwicke, Leindotter, Inkarnatklee, Alexandrinerklee | 15 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | AN 7 Rotmilanschutz Niedersachsen (einjährig) | Luzerne, Rotklee, Rotschwingel, Wiesenlieschgras, Knaulgras | 6-10 kg/ha | bis 15.04. oder Herbstsaat bis 30.10. |
| AUM | AN 8 Feldvogelinseln Niedersachsen (mehrjährig) | Winterfuttererbse, Winterwicke | 100-150 kg/ha | bis zum 30.10. |
| AUM | Buntbrache NRW (mehrjährig) | Esparsette, Hafer, Felderbse, Luzerne, Waldstaudenroggen, Öllein, Ölrettich, Winterrübsen, Rohrschwingel, Sonnenblume, Phacelia, Alexandrinerklee, blaue Bitterlupine, Koriander, Rotklee, Sommerraps, Weißklee, Knaulgras, Ramtillkraut | 25-30 kg/ha | bis 15. Mai |
| AUM | Buntbrache NRW ohne Kreuzblütler | Hafer, Rotklee, Esparsette, Weißklee, Felderbse, Inkarnatklee, Perserklee, Koriander, Öllein, Phacelia, Ramtillkraut, Sonnenblume, Fenchel | 20-25 kg/ha | bis 15. Mai |
| Brache | Brache ohne Klee | Deutsches Weidelgras, Welsches Weidelgras | 15-20 kg/ha | März bis Oktober |
| Brache | Brache mit Klee | Rotschwingel, Weißklee | 30-35 kg/ha | März bis Oktober |
| Brache | Rotationsbrache | Öllein, Inkarnatklee, Esparsette, Bockshornklee, Rotklee | 30-35 kg/ha | März bis August |